

ازد

(درمان ریشه دندان)



مراقبت های پس از درمان ریشه دندان:

- ۱ - تا دو ساعت پس از درمان از خوردن خودداری نموده و تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر دهان برای خوردن غذا استفاده نمایید.
- ۲ - بعد از برطرف شدن بیحسی، در صورت وجود درد می توانید از داروهای مسکن مثل: استامینوفن یا ژلوفن استفاده نمایید.
(در صورت وجود سابقه بیماری یا حساسیت دارویی با دندانپزشک خود مشورت نمایید.)

زمان

تاریخ و روز



امام صادق(ع):

مرکز تخصصی دندانپزشکی امام صادق(ع)

مسئول زدن باعث خشنودی خداوند می گردد.

تهران - خیابان فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز - کوچه شهید فیروز دهقان(هشتمن) پلاک ۲۶

www.ikdc.ir



۰۱۵۷۳۳۱۹۱ info@ikdc.ir ۰۸۸۹۵۱۸۴۱ ۰۸۸۹۵۱۸۴۱-۴۴

درمان ریشه دندان:

وقتی پوسیدگی دندان عمیق شود و به قسمت مرکزی دندان که حاوی عروق و اعصاب است برسد، درمان ریشه دندان میباشد. انجام گردد (درمان ریشه، روت کانال تراپی واندو همه معنای واحد دارند). در این حالت پس از حذف پوسیدگی و عفونت کanal ها تمیز شده و با مواد خاص پر میشوند.

توجه نمایید که درمان ریشه تنها قسمتی از درمان شماست و پس از انجام این درمان بسته به نظر دندانپزشک معالج، شما به درمان دیگر نظیر ترمیم یا پروتز نیاز خواهید داشت. دقت فرمایید تا زمانیکه درمان تکمیلی برای شما انجام نشده دندان بسیار شکننده خواهد بود لذا از خوردن مواد غذایی سفت تا قبل از تکمیل درمان خودداری نمایید.