

پروتز ثابت



پروتز ثابت چیست؟

این درمان روی دندان هایی که تخریب شدید دارند یا دندان هایی که درمان ریشه شده اند، انجام می گیرد تا دندان را از خطر تخریب یا شکستن محافظت نمایند و شامل روکش و بریج می باشند.

بریج: هنگامی که یک یا چند دندان از دست رفته باشد از آن استفاده می شود.

مراقبت های پس از درمان پروتز:

۱. توصیه می شود تا ۲۴ ساعت پس از چسباندن روکش فشار جویدن روی آن نباشد.

۲. به جهت بهداشت دندان روکش شده روزی دو بار مسواک و استفاده از نخ دندان الزامی است.

۳. در صورت احساس بلندی از وارد کردن فشار به روکش اجتناب نموده و در اولین فرصت به دندانپزشک معالج خود مراجعه نمایید.

۴. حد فاصل روکش و دندان را با استفاده از نخ دندان تمیز نموده و در پروتز های چند دندانی (بریج) زیر روکش ها را می بایست با استفاده از نخ سوپر فلاس تمیز نمود. (البته این کار می بایست پس از ۲۴ ساعت از نصب روکش انجام شود تا چسب روکش محکم شده باشد).

زمان	پزشک معالج	تاریخ و روز



مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمینی (ره)

امام صادق (ع):
مسواک زدن حافظه را تقویت می نماید.

تهران - خیابان فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز - کوچه شهید فیروز دهقان (هشتم) پلاک ۲۶
۸۸۹۵۱۸۴۱-۴۴ ☎ ۸۸۹۵۱۸۴۱ ☎ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ☎ ۱۴۱۵۷۳۳۱۹۱ ✉ info@ikdc.ir 🌐 www.ikdc.ir