

پروتز متحرک



۵. هفته‌ای یکبار دندان مصنوعی را داخل یک محلول ضد عفونی کننده قرار دهید.
۶. در صورت عدم استفاده، پروتز را در ظرف آب نمک قرار دهید.
۷. استفاده از پروتز متحرک به مدت طولانی سایش دندان‌ها، تحلیل استخوان و لثه‌ها و گاهی لقی و پوسیدگی دندان‌های پایه را به دنبال دارد که نیاز به ترمیم و تعویض پیدا می‌کند.
۸. از وسایل فلزی جهت تمیز کردن فضای خالی بین دندان‌ها استفاده نفرمائید. استفاده از خلال چوبی نیز می‌تواند موجب تحلیل لثه شود.

زمان	پزشک معالج	تاریخ و روز

اماکن صادق (ع):
مسواک بزنید که فرشتگان نیز خرسند می‌شوند.

مرکز تخصصی دندانپزشکی امام خمینی (ره)

تهران - خیابان فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز - کوچه شهید فیروز دهقان(هشتمن) پلاک ۲۶
۰۴۴-۸۸۹۵۱۸۴۱ ۱۴۱۵۷۳۳۹۱ ۰۰۱.....۸۸۹۵۱۸۴۱ info@ikdc.ir

پروتز متحرک:

دندانپزشک جهت جایگزینی دندان‌های از دست رفته، اقدام به ساخت پروتز متحرک می‌نماید. سپس قالب بدست آمده از دهان بیمار را برای ساخت پروتز به لابراتوار می‌فرستد. لابراتوار، پس از ساخت، پروتز را برای آزمایش و مرحل تكميلی به دندانپزشک تحويل داده و دندانپزشک با توجه به شرایط بیمار، به لابراتوار دستور مراحل بعدی را می‌دهد. پروتز آماده شده در دهان بیمار قرار گرفته و آخرین تنظیمات اعمال می‌گردد.

مراقبت‌های پروتز متحرک:

۱. هنگام تمیز کردن پروتز، مراقب افتادن آن از ارتفاع باشید.
۲. با مسوак مخصوص دندان مصنوعی، سطح داخلی و خارجی پروتز و با یک مسواك بسیار نرم لثه و مخاط داخلی دهان تمیز شود.
۳. بعد از مسواك با استفاده از دهان شویه‌های مناسب(باتجویز پزشک) دهان را ضد عفونی کنید.
۴. قبل از خواب، پروتز متحرک حتماً از دهان خارج گردد.