

مر اقبب های پس از ترمیم دندان:

۵. پس از بر طرف شدن بی حسی، در صورتی که در ترمیم خود احساس بلندی نمودید از وارد کردن فشار بر روی دندان ترمیم شده اجتناب نموده و برای اصلاح آن به دندانپزشک خود مراجعه نمایید.



۱. پس از ترمیم آمالگام (مواد غیر هم رنگ دندان) حداقل تا ۲ ساعت از خوردن غذا یا وارد کردن فشار به دندان تازه ترمیم شده خود داری نموده و تا ۲۴ ساعت از سمت دیگر برای جویدن غذا استفاده شود.

۲. دندان هایی که با آمالگام ترمیم می شود ممکن است چندین هفته به سرما و گرما حساس باشند که معمولاً این حساسیت در هفته های آتی روند کاهشی خواهد داشت، اگر حساسیت دندان با گذشت زمان کمتر نشود با دندانپزشک خود مشورت نمایید.

۳. در دندان هایی با پوسیدگی عمیق ابتدا سعی می شود بوسيله درمان ترمیمی (که درمان مناسبتری است) معالجه انجام گردد اما در صورت بروز درد شدید و مداوم، درمان ریشه ضرورت می یابد.

۴. در ترمیم های هم رنگ دندان بهتر است از مصرف مواد غذایی دارای رنگدانه از جمله قهوه و چای تا ۲۴ ساعت خودداری گردد.



ترمیم

ترمیم دندان:

دندان به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت بهداشت ممکن است دچار پوسیدگی شود. البته عوامل دیگری مانند ژنتیک، ردیف نبودن دندان ها و تغذیه نامناسب نیز در ایجاد پوسیدگی موثر است. زمانی که دندان پوسیده می شود ترکیب شیمیایی آن دچار تغییر گشته، نرم و سست می شود و محلی جهت تجمع میکروب می گردد. در صورت درمان نشدن، دندان دچار تخریب شده و از دست می رود. دندانپزشک با دریل مخصوص دندانپزشکی، نسج سالم دندان را از پوسیدگی و میکروب پاک کرده و قسمت از بین رفته را با توجه به موقعیت دندان با مواد مخصوص ترمیم می نماید. هرچه میزان از بین رفتن بافت دندان کمتر باشد، درصد موفقیت ترمیم دندان بیشتر و احتمال عود پوسیدگی آن کمتر می گردد.

زمان	تاریخ و روز

